












CO	KDY	JAK	ČÍM	KONCENTRACE - EXPOZICE	ÚČINNOST			
	kontaktní plochy (kíčky, madla apod.)	1x denně nebo dle potřeby	dez. roztokem vytřít namokro a nechat zaschnout	INCIDIN RAPID	0,25% - 60 minut 0,5% - 30 minut	A(B)(V) AB(V)		
	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky	1 x denně exponované prostory		INCIDIN PRO	0,25% - 30 minut 0,5% - 15 minut	A(B)(V) A(B)(V)		
		3 x týdně společné prostory		MEDICARINE	2 tablety na 10 l vody - 30 minut 3 tablety na 10 l vody - 30 minut	AB(V)* ABTMV*		
		malé plochy, vozíky, lehátka, přístroje		dle potřeby	postříkat a nechat zaschnout nebo dle postupu	INCIDIN LIQUID	neředí se - do zaschnutí	A(B)TM(V)*
		shoz prádla		dle stanoveného postupu		INCIDIN FOAM	neředí se - do zaschnutí	A(B)TM(V)*
				malé plochy, vyšetřovací a zátkové stoly, vozíky, instrumentální stoly, lehátka, přístroje		dle potřeby	utřít ubrouskem	INCIDIN OXYFOAM S
dle potřeby		utřít ubrouskem	SANICLOTH AKTIV		neředí se - do zaschnutí	ABTMV*		
			INCIDEN N		neředí se - do zaschnutí	A(B)TM(V)*		
INCIDIN OXYWIPES S		neředí se - do zaschnutí	ABCTMV*					
	nádoba toaletní křesla, nádoby na moč, emitní misky, podložní misky, umyvadlo z umělé hmoty	v případě potřeby	manualní	MEDICARINE	3 tablety na 10 l vody - 30 minut	ABTMV*		
			automatické	dle mycího automatu		-		
	odpady, kanálky, sifony	1 x 14 dní	prolít připraveným roztokem	MEDICARINE	1 tableta do 1,5 l vody 30 minut a déle	ABTMV		
	wc štětky	1 x týdně	naplnit nádobku na WC štětku	MEDICARINE	2 tablety na 10 l - 30 minut			
	kontaminace biologickým materiálem	ihned po znečištění předměty ponořit do dezinfekčního roztoku, plochy překrýt buničitou vatou namočenou do dezinfekčního roztoku, po expoziční době následuje mechanická očista		MEDICARINE	3 tbl. / 10 l vody - 30 minut	ABTMV*		
	epidemiologicky závažné situace	plochy a předměty		INCIDIN ACTIVE	1 % - 60 minut	ABCTMV*		
		dezinfekce malých povrchů		INCIDIN OXYFOAM S INCIDIN OXYWIPES S	neředí se - 3 až 30 minut	ABCTMV		
		dezinfekce rukou		SKINMAN SOFT PROTECT	HDR neředí se - 2 minuty	ABTMV		
	vany, vřivky, koupací lůžko	po použití nebo dle potřeby	dokonale smočit roztokem, nechat působit, opláchnout	INCIDIN ACTIVE	1% - 5 minut	A(V)		
				INCIDIN OXYDES	1% - 5 minut			
	dekontaminace a dezinfekce nástrojů a pomůcek	zcela ponořit do roztoku, mýt pod hladinou roztoku, nechat působit předepsanou dobu, oplach pitnou vodou		SEKUSEPT AKTIV	1% - 60 minut 2% - 10 minut	A(B)TMV* ABTM(V)		
				SEKUSEPT PLUS	1% - 15 minut	A(B)V		
	dezinfekce a ošetřování katétrů a spojek reziiduální účinek 24 hodin	postříkat nebo otřít		CITROCLOREX 2% MD	neředí se - 60 vteřin	A(B)V		
	mytí rukou	několikrát denně	vodou a mycí emulzí	TEKUTÁ MÝDLA MANISOFT FOAM	neředí se	bez dezinfekčního účinku		
	mytí rukou s dezinfekčním účinkem	několikrát denně	vodou a mycí emulzí	SKINSAN SCRUB N	neředí se	30 vteřin 60 vteřin	A(B) A(B)(V)	
	hygienická dezinfekce rukou	před a po ošetření každého pacienta a při jakékoliv kontaminaci	vetřít do suchých rukou	SKINMAN SOFT N	neředí se	30 vteřin	A(B)T(V)	
				SPIRIGEL COMPLETE	neředí se	30 vteřin	ABT(V)	
				SKINMAN SOFT PROTECT (FF)	neředí se	30 vteřin 120 vteřin	ABTMV*	
	dezinfekce kůže	před vpichy nebo jinými zákroky	postříkat nebo otřít tamponem	SKINSEPT F	neředí se	15 vteřin	A(B)(V)	
		před vpichem především zavádění katétrů		CITRO CLOREX 2% (reziiduální 6 hodin)	neředí se	30 vteřin	A(B)(V)	
	sliznice	k dezinf. sliznic dutiny ústní, cévkování, urologie, hygienu dutiny ústní		SKINSEPT MUCOSA	neředí se	1 min. do zaschnutí	A(B)(V)	
	ruce a pokožka, regenerace	dle potřeby	vetřít do rukou	SILONDA, SILONDA LIPID, SILONDA SENSITIVE				
	prevence plísni	denně	vystříkat obuv	INCIDIN MSE	neředí se	1 min., zaschnutí	A(B)(V)	



**Návod k použití:** odšroubujte bílý uzávěr. V případě otočení láhve dnem vzhůru (o 180°) vyteče z dávkovače 20 ml koncentrátu, pro dávku dalších 20 ml je třeba znovu otočit láhev do polohy dnem dolů a v případě vyšší dávky postup opakovat – otočit opět láhev dnem vzhůru. Pozor - pokud otočíte láhev pouze o 90°, vytéká z ní koncentrát kontinuálně bez přerušení. Tento způsob aplikace poslouží v případě, kdy se provádí ředění pomocí odměry.

1 dávka do 8 litrů studené vody 0,25 % roztok  
2 dávky do 8 litrů studené vody 0,50 % roztok  
3 dávky do 8 litrů studené vody 0,75 % roztok

Láhev je vybavena dvěma uzávěry – hrdlo se zeleným uzávěrem slouží k doplňování koncentrátu z větších balení (6 l kanistr), hrdlo s bílým uzávěrem obsahuje integrovaný dávkovač a slouží k dávkování koncentrátu do předem definovaného množství vody.

- A** usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub  
**B** virucidní účinek proti norovirům (polio, adeno a norovirus (MNV))  
**(B)** virucidní účinek na široké spektrum virů (včetně rotavirů u dezinfekce rukou)  
**C** inaktivace bakteriálních spór  
**T** usmrcení mykobakterií kompl. M. Tuberculosis (testováno v SÚZ Praha)  
**M** usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií (v případě masivní kontaminace aviačními mykobakteriemi je nutno expozici zdvojnásobit)  
**V** fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby  
\* včetně MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus)

Komplexní program dezinfekčních prostředků Ecolab je z hlediska rezistence mikroorganismů řešen užitím různých účinných látek tak, že je možno střídání v rámci tohoto dezinfekčního plánu. **Přípravky ředit studenou vodou!**

Při střídání produktů s jinou účinnou látkou lze rozpisu omýt povrchy běžným saponátem.

■ Leden, Březen, Květen,  
Červenec, Září, Listopad

■ Únor, Duben, Červen, Srpen,  
Říjen, Prosinec

■ Speciální produkty na určené aplikace