

Příloha č.3 k dohodě PPK – 174a/73/19

Druhové složení travních směsí

Druhově obohacené směs. Výsevek 30 kg/ha.

	Český název a odrůda	Složení (%)
Trávy 95%		
	Psárka luční 'ZUBERSKÁ'	15
	Bojínek luční 'SOBOL'	10
	Ovsík vyvýšený 'ROŽNOVSKÝ'	1
	Srha laločnatá 'BARIDANA'	4
	Lipnice luční 'BALIN'	10
	Poháňka hřebenitá 'ROŽNOVSKÁ'	12
	Trojštět žlutavý 'HORAL'	3
	Kostřava luční 'OTAVA'	14
	Kostřava červená dl.výb. 'PETRUNA'	6
	Kostřava červená dl. výb. 'LEVOČSKÁ'	20
Jeteloviny 5%		
	Tolice dětelová 'EKOLA'	1
	Úročník bolhoj 'PAMIR'	0,5
	Čičorka pestrá 'EROZA'	1
	Štírovník růžkatý 'LOTAR'	0,5
	Jetel plazivý 'JURA'	0,8
	Jetel luční 'START'	1,2

Regionální travní směs pro suché trávníky pro obnovu travních porostů v regionu Moravského krasu. Výsevek 20 kg/ha.

	Latinský název a odrůda	Český název
Trávy 90%		
	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Tomka vonná
	<i>Avenula pubescens</i>	Ovsíř pýřitý
	<i>Brachypodium pinnatum</i>	Válečka prapořitá
	<i>Briza media</i>	Třeslice prostřední
	<i>Bromus erectus</i>	Sveřep vzpřímený
	<i>Festuca rupicola</i>	Kostrava žlábkatá
	<i>Festuca valesiaca</i>	Kostrava walliská
	<i>Koeleria macrantha</i>	Smělek štíhlý
	<i>Koeleria pyramidata</i>	Smělek jehlancovitý
	<i>Melica ciliata</i>	Strdivka brvitá
	<i>Melica transsilvanica</i>	Strdivka sedmihradská
	<i>Phleum phleoides</i>	Bojínek tuhý
	<i>Phleum pratense</i>	Bojínek luční
	<i>Poa angustifolia</i>	Lipnice úzkolistá
	<i>Poa pratensis</i>	Lipnice luční
	<i>Sesleria caerulea</i>	Pěchava vápnomilná
	<i>Trisetum flavescens</i>	Trojštět žlutavý
Byliny 5 %		
	<i>Acinos arvensis</i>	Pamětník rolní
	<i>Agrimonia eupatoria</i>	Řepík lékařský
	<i>Achillea millefolium</i>	Řebříček obecný
	<i>Asperula cynanchica</i>	Mařinka barvířská
	<i>Betonica officinalis</i>	Bukvice lékařská

	<i>Bupleurum falcatum</i>	Prorostlík srpovitý
	<i>Campanula patula</i>	Zvonek rozkladitý
	<i>Campanula rotundifolia</i>	Zvonek okrouhlolistý
	<i>Centaurea jacea</i>	Chrpa luční
	<i>Centaurea rhenana</i>	Chrpa latnatá
	<i>Centaurea scabiosa</i>	Chrpa čekánek
	<i>Cirsium eriophorum</i>	Pcháč bělohavý
	<i>Clinopodium vulgare</i>	Klinopád obecný
	<i>Crepis biennis</i>	Škarda dvouletá
	<i>Daucus carota</i>	Mrkev obecná pravá
	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Hvozdík kartouzek
	<i>Echium vulgare</i>	Hadinec obecný
	<i>Galium album</i>	Svízel bílý
	<i>Galium boreale</i>	Svízel severní
	<i>Galium verum</i>	Svízel syřišťový
	<i>Helianthemum grandiflorum</i>	Devaterník velkokvětý
	<i>Hypericum maculatum</i>	Třezalka skvrnitá
	<i>Hypericum perforatum</i>	Třezalka tečkovaná
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Prasetník kořenatý
	<i>Knautia arvensis</i>	Chrastavec rolní
	<i>Leontodon autumnalis</i>	Máchelka podzimní
	<i>Leontodon hispidus</i>	Máchelka srstnatá
	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Kopretina bílá
	<i>Origanum vulgare</i>	Dobromysl obecná
	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Bedrník obecný
	<i>Plantago lanceolata</i>	Jitrocel kopinatý

	<i>Plantago media</i>	Jitrocel prostřední
	<i>Potentilla argentea</i>	Mochna stříbrná
	<i>Primula veris</i>	Prvosenka jarní
	<i>Prunella laciniata</i>	Černohlávek dřípený
	<i>Prunella vulgaris</i>	Černohlávek obecný
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Pryskyřník hlíznatý
	<i>Rhinanthus minor</i>	Kokrhel menší
	<i>Salvia pratensis</i>	Šalvěj luční
	<i>Salvia verticillata</i>	Šalvěj přeslenitá
	<i>Sanguisorba minor</i>	Krvavec menší
	<i>Scabiosa ochroleuca</i>	Hlaváč bleďožlutý
	<i>Seseli annuum</i>	Sesel roční
	<i>Silene inflata</i>	Silenka nadmutá
	<i>Silene latifolia</i>	Silenka širokolistá
	<i>Silene nutans</i>	Silenka níčí
	<i>Silene vulgaris</i>	Silenka nadmutá
	<i>Teucrium chamaedris</i>	Ožanka kalamandra
	<i>Thymus pulegioides</i>	Mateřídouška vejčitá
	<i>Tragopogon orientalis</i>	Kozí brada východní
	<i>Verbascum austriacum</i>	Divizna jižní rakouská
	<i>Veronica teucrium</i>	Rozrazil ožankový
Jeteloviny 5 %		
	<i>Anthyllis vulneraria 'Pamir'</i>	Úročník bolhoj
	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Kozinec sladkolistý
	<i>Lathyrus pratensis</i>	Hrachor luční
	<i>Lotus corniculatus 'Lotar'</i>	Štírovník růžkatý
	<i>Medicago falcata</i>	Tolice srpovitá

	<i>Medicago lupulina</i>	Tolice dětelová
	<i>Onobrychis viciifolia</i>	Vičinec ligrus
	<i>Securigera varia</i>	Čičorka pestrá
	<i>Trifolium alpestre</i>	Jetel alpský
	<i>Trifolium aureum</i>	Jetel zlatý
	<i>Trifolium medium</i>	Jetel prostřední
	<i>Trifolium montanum</i>	Jetel horský
	<i>Trifolium pratense</i>	Jetel luční
	<i>Trifolium repens</i>	Jetel plazivý
	<i>Vicia cracca</i>	Vikev ptačí
	<i>Vicia tenuifolia</i>	Vikev tenkolistá

Návod na založení květnaté louky

- Osivo skladujeme na suchém místě v uzavřených obalech.
- Před výsevem doporučujeme obsah sáčku důkladně promíchat. Stejně tak je třeba promíchávat osivo v zásobníku secího stroje nebo odstředivého rozmetadla.
- Louku vyséváme velmi mělce do hloubky max. 5 mm do zkpřené, urovnané a odplevelené půdy. Před výsevem nehnojíme!
- V roce výsevu rostou hlavně trávy a pouze kořínky lučních rostlin.
- Odplevelovací seč provedeme šetrně při výšce porostu cca 20-30 cm.
- Květnatou louku sekáme nejlépe lištovou nebo bubnovou travní sekačkou nebo kosou na výšku minimálně 4-5 cm nad povrchem půdy.
- Louka kvete postupně ve druhém až třetím roce, počet sečí 1-2x za rok. Termín sečí: 1. seč konec května, 2. seč září
- Kosení musí být vždy se sběrem pokosené biomasy. Porost se nesmí mulčovat.