

## Dezinfekční plán pro standardní obory Oblastní nemocnice Náchod a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stolky, vozíky, podložní misy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,26%-0,6%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dáv. láhev
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TMV	
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%-0,6%	60-15 min	A(B)TMV	Pouze ortopedie NRK
Malé plochy	dezinfekce postříkem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se		ABTMV	
	dezinfekce otěram	i UZ sondy,citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol,KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)JV	
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV	
Citlivé materiály	Inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
		omýt roztokem			2%	15 min	ABCTMV	
			TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	60 min	A(B)JV	
Epidemiologicky závazné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,16%	15 min	ABCTMV	1 sáček/SI
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min. Možno přidat seponit s neutrálním nebo zásaditým pH
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	plně virucidní
	Biologické znečištění	buničinu smočít v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postříkky neaplikovat do biologického materiálu)		DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTMV
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
Nástroje a přístroje, odsávačky	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsávaček		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
			DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV	
Vany	rehabilitační vany	omýt roztokem,nechat působit, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	5 min	A(B)JV	
		potrubí RHB van	SAVAGRO A+	chloman sodný	0,25%	20 min	A(B)JV	
			SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%	20 min	—	teplota vody 40-60°C
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla TBC=30 min
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	2 min	ABTMV	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV	
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	BALMEA/BALMEA PROTECT SILONDA	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	SKINSEPT G	alkohol	neředí se		A(B)TMV	nechat vždy zcela zaschnout
			Braunoderm	alkohol, PVP-jod			A(B)TMV	
Prevence plísni nohou	postřík	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)JV	vhodné pro diabetiky	
Katétry	katétry, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRSA	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINMAN SCRUB	triclosan	neředí se	30 s	A(B)JV	mycí emulze
			PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se		A(B)JV	
Sliznic	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cávkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)JV	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA
			OCTENISEPT	octeninidihydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)JV	

## Dezinfekční plán intenzivních oborů Oblastní nemocnice Náchod a.s.

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka	
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlahy, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dáv. láhev	
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)TMV		
Malé plochy	dezinfekce postříkem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez	
			DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se		ABTMV		
	dezinfekce otěrem	i UZ sondy, citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol, KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV		
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV		
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)JV		
			SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV		
Citlivé materiály	inkubátory, akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV		
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV		
	omýt roztokem		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV		
			TERRALIN PROTECT	alkohol, KAS	2%	15 min	ABCTMV		
					0,5%	60 min	A(B)JV		
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,16%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l	
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.		
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	A(B)TMV + Cl. diff.		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV		
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2h/30min. Možné přičat seponát s neutrálním nebo zásaditým pH	
	ruce	virové náznaky	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	pné virucidní	
Biologické znečištění	buničinu smížit v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postříkací neaplikovat do biologického materiálu)		DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se	1 min	ABTMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu	
Sifony	tbi nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc	
Nástroje a přístroje, odsávečky	dekontaminace a dezinfekce chirurgických nástrojů a odsáveček		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV		
			DISCLEEN EXTRA	amin, KAS	1%	15 min	A(B)TMV		
			SEKUZYME	enzym	0,5%	15 min	—		
	mytí přístrojů	ponořit do roztoku, nechat působit, oplach purifikovanou (sterilní (VSD) vodou vodou	SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	4%	15 min	ABTMV		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	10 min	ABTMV		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV		
vyšší stupeň dezinfekce (VSD)		SEKUSEPT FORTE	aldehydy, KAS, glyoxal	5%	60 min	ABCTMV			
Nádoby	nádoby	očistit, ponořit do roztoku, oplach	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tbl/10 l	5 min	ABV	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla TBC=30 min	
Sliznice	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysele.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV		
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV		
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV		
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol					
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV		
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV		
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	BALMEA/BALMEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky				
	dezinfekce kůže před vpichem	otřít tamponem nebo postříkat	SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s	punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min
			SKINSEPT G	alkohol	neředí se			A(B)TMV	nechat vždy zcela zaschnout
	dezinfekce operačního pole	nanést sterilním tamponem	Braunoderm	alkohol, PVP-jod				A(B)TMV	
	Prevence plisní nohou	postřík	INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se		do zaschnutí	A(B)JV	vhodné pro diabetiky
	Katétrý	katétrý, spojovací hadičky		CITROCLOREX 2% MD (zelená etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)TMV	remanentní účinek 24 hodin - použití při každé aplikaci
MRS A	dekolonizace MRSA	3 x denně celé tělo včetně vlasů	SKINMAN SCRUB	tricosan	neředí se		A(B)JV	mycí emulze	
			PROSAVON SCRUB	chlorhexidin, KAS	neředí se		30 s		A(B)JV
Sliznic e	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)JV	nepoužívat do očí dekolonizace MRSA	
			OCTENISEPT	octenidinyhydrochlorid	neředí se		60 s		A(B)JV

**Dezinfekční plán pro laboratorní obory  
Oblastní nemocnice Náchod a.s.**

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Koncentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stolky, vozíky, podložní mísy, umývadla	odstranit nečistoty z podlož.mís, ponořit do roztoku	INCIDIN EXTRA N	KAS, glukoprotamin	0,25%-0,5%	60-15 min	A(B)TMV	TBC 60-30 min, dáv. láhev
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)J	Pouze pro PKBD NBR
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	60 min	A(B)TMV	
Malé plochy	dezinfekce postřikem		INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	i pro lesklé povrchy a nerez
			DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se		ABTMV	
	dezinfekce otěrem	citlivé materiály	DESTIX MED N/Lemon	alkohol, KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	do zaschnutí	A(B)TMV	
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	do zaschnutí	A(B)J	
		SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	do zaschnutí	ABTMV		
Citlivé materiály	akryláty, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít	INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	5 min	A(B)TMV	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	A(B)TMV	
	omýt roztokem		SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%	15 min	A(B)TMV	
					2%	15 min	ABCTMV	
Epidemiologicky závažné situace	plochy, předměty	omýt roztokem	DESAM SOLID	chlordioxid	0,15%	15 min	ABCTMV	1 sáček/5l
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	ABTMV + Cl. diff.	A(B)TMV + Cl. diff.
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min		
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tbl/10 l	30 min	ABTMV	TBC 2tbl/30min Možno přdat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH
	ruce	virové nákazy	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	2 min	ABTMV	plně virucidní
Biologické znečištění	buničinu smočít v dezinfekčním roztoku, překrýt kontaminovanou plochu, exponovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřiky neaplikovat do biologického materiálu)		DESPREJ	alkohol, KAS	neředí se	1 min	ABTMV	buničinu po uplynutí exp. doby do inf. odpadu
Sifony	tbl nebo roztok	denně	MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tbl/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejlépe přes noc
RUCE A POKOŽKA	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR před a po ošetřování pacienta, po manipulaci s prádlem a infekčním materiálem, CHDR před úkony, porušujícími integritu kůže.	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.undec	cca 3ml/2x5ml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	pro alergiky
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	0,5/2x1,5min	A(B)TMV	
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol				
			SPIRIGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	0,5/2x1,5min	ABTMV	
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	0,5/2x 1,5 min	A(B)TMV	
	regenerace rukou	po mytí a dezinfekci	BALMEA/BALMEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky			
			SILONDA					
dezinfekce kůže před vpíchem	otřít tamponem nebo postříkat		SKINSEPT F	alkohol, peroxid vod.	neředí se	min. 15 s punkce 1 min	A(B)TMV	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min

Poznámka: dezinfekční přípravky, které nejsou obsaženy v dezinfekčním plánu lze použít pouze v souladu se schváleným Provozním řádem nebo tam, kde je stanoveno v návodu výrobce

