

	Použití	Způsob	Přípravek	Účinná látka	Konzentrace	Expozice	Účinnost	Poznámka			
Plochy, povrchy, předměty	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, podložní misy, umyvadla	odstranit nečistoty z podlož.mis, ponořit do roztoku	INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS	0,25-0,5%	60-30 min	AB(V)	dávková láhev			
			INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%, 0,50%, 1,5%	15 min, 30 min, 60 min	A(B)(V), A(B)(V), A(B)(TMV)	dávková láhev			
			INCIDIN OXYDES	peroxid vodíku, KAS	1%	30 min	A(B)(V)	dávková láhev			
			INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,25%, 0,50%, 1,50%, 3,00%	30 min, 15 min, 60 min, 30 min	A(B)(V), A(B)(V), A(B)(TMV)				
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tb/10 l	5 min	A(B)(V)	TBC 20ar/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH			
			INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	1 min	A(B)(V)				
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)	i pro lesklé povrchy a nerez			
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	1 min, 2 min, 5 min, 15 min	A(B)(V), ABTMV	nerez, akreno, SV40 Cl.diff			
			DESTIX MED N Lemon	alkohol,KAS	neředí se	1 min	A(B)(TMV)				
			INCIDES N (bal 90 ks)	alkohol	neředí se	1 min	A(B)(V)				
			DESTIX MK 75	KAS	neředí se	1 min	A(B)(V)				
			Malé plochy	dezinfekce ořezem	i UZ sondy,citlivé materiály	SANICLOTH ACTIVE	KAS	neředí se	30 min, 15 min, 1 min	ABTV, AB(TV), A(B)(V)	
INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek				1 min, 5 min, 15 min, 30 min	A(B)(V), A(B)(TMV), ABCTMV	akreno, SV40 Cl.diff. + MNV			
INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se				3 min, 30 sec.	A(B)(V)				
DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se				5 min	ABTM(V)				
SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%, 2%				60 min, 15 min	ABTM(V), ABCTMV				
TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%				60 min	A(B)(V)	JEN pro inkubátory			
INCIDIN ACTIVE	peruhličitan disodný	2%				15 min	ABCTMV				
INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek				5 min	A(B)(TMV) + Cl. diff.				
INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna				5 min	ABTMV + Cl. diff.				
INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS	2%				60 min	AB(V) + Cl.diff.				
MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tb/10 l, 1 tb/1,5l vody, 2 tb/1,5l vody, 5tb/1,5l vody				30 min, 15 min, 15 min, 15 min	ABTMV, ABTMV + Cl.diff., ABTMV + Cl.diff., ABCTMV	TBC 20ar/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH			
Cítilivé materiály	inkubátory, akrylát, citlivé plasty	nastříkat, rozetřít omýt roztokem				INCIDIN FOAM	glukoprotamin	neředí se	3 min, 30 sec.	A(B)(V)	
			DESPREJ SENSITIVE	KAS	neředí se	5 min	ABTM(V)				
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%, 2%	60 min, 15 min	ABTM(V), ABCTMV				
			TERRALIN PROTECT	alkohol,KAS	0,5%	60 min	A(B)(V)	JEN pro inkubátory			
			INCIDIN ACTIVE	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV				
			INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	ubrousek	5 min	A(B)(TMV) + Cl. diff.				
			INCIDIN OXYFOAM S	peroxid vodíku	pěna	5 min	ABTMV + Cl. diff.				
			INCIDIN RAPID	aldehyd,KAS	2%	60 min	AB(V) + Cl.diff.				
			MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	2tb/10 l, 1 tb/1,5l vody, 2 tb/1,5l vody, 5tb/1,5l vody	30 min, 15 min, 15 min, 15 min	ABTMV, ABTMV + Cl.diff., ABTMV + Cl.diff., ABCTMV	TBC 20ar/30min. Možno přidat saponát s neutrálním nebo zásaditým pH			
			Epidemiologicky závazné stuce	plochy, předměty	omýt roztokem	SKINMAN SOFT PROTECT / FF	alkohol	neředí se	30 sec	ABTM(V)	plně vstřícní
						INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	5 min	A(B)(TMV)	
						DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)	baričnou pro uplynulý exp. doby do inf. období
MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2tb/10l vody				30 min	ABTMV				
MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tb/1,5 l vody				30 min	ABTMV	nechat nejméně přes noc			
GIGAZYME XTRA	KAS, tenzidy, enzymy	1%				15 min	A(B)(V)				
DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1%				15 min	A(B)(TMV)				
SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	1,5%, 2,5%, 4%				60 min, 30 min, 15 min	A(B)(V)				
STABMED FRESH	amin, tenzidy	0,5%				15 min	A(B)(V)				
ANIOSEPT ACTIV	aktivní kyslík	1%				15 min	ABTMV+Cl.diff.				
SEKUSEPT AKTIV	enzym	0,5%				15 min	---				
Biologické značení	baričnou směsí v dezinfekčním roztoku, překřít kontaminovanou plochu, expozovat, po té aplikovat plošnou dezinfekci (postřik reagikovat do biologického materiálu)					INCIDIN LIQUID	alkohol	neředí se	5 min	A(B)(TMV)	
			DESPREJ	alkohol,KAS	neředí se	1 min	ABTM(V)				
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2tb/10l vody	30 min	ABTMV				
			MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	1tb/1,5 l vody	30 min	ABTMV	nechat nejméně přes noc			
			GIGAZYME XTRA	KAS, tenzidy, enzymy	1%	15 min	A(B)(V)				
			DISCLEEN EXTRA	KAS, amin	1%	15 min	A(B)(TMV)				
			SEKUSEPT PLUS	glukoprotamin	1,5%, 2,5%, 4%	60 min, 30 min, 15 min	A(B)(V)				
			STABMED FRESH	amin, tenzidy	0,5%	15 min	A(B)(V)				
			ANIOSEPT ACTIV	aktivní kyslík	1%	15 min	ABTMV+Cl.diff.				
			SEKUSEPT AKTIV	enzym	0,5%	15 min	---				
			SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	2%	15 min	ABCTMV	denně čerstvý			
			Sifony	tbl nebo roztok	denně	KORSOLEX PAA	kyselina peroctová	neředí se	15 min	ABCTMV	denně čerstvý
INCIDIN PRO	amin, KAS	0,25%				30 min	A(B)(V)				
SEKUSEPT AKTIV	peruhličitan disodný	1%				60 min	ABTM(V)				
ANIOSEPT ACTIV	aktivní kyslík	1%				15 min	ABTMV+Cl.diff.				
MEDICARINE	dichlorizokyan. sodný	2 tb/10 l				5 min	ABV				
INCIDIN ACTIVE	peruhličitan disodný	1%				5 min	A(V)				
SAVAGRO A+	chloman sodný	0,25%				20 min	A(V)				
Kyselina amidosulfonová	---	---				---	---	dle doporučení servisních techniků/pracovníků			
SAVAGRO K	kys. fosforečná	0,25%				30 min	---	teplota vody 40-60°C			
MEDICARINE	dichlorizokyan.sodný	2 tb/10 l				5 min	A(B)(V)	Před dezinfekcí odstranit zbytky jídla.TBC=30 min			
DESAM PRIM	chlór	2%, 5%				45 min, 30 min	ABV, ABTMV + Cl. diff.				
DESAM EXTRA	KAS, amin	0,5%, 1%				15 min, 15 min	A(B)(V), A(B)(V)				
Nádobí	nádobí	očistit, ponořit do roztoku, opláchnout	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS, kysel.Lundec	neředěná, 4 ml cca 3ml/2x5ml	30 sec./2x1,5min	ABTM(V)				
			SKINMAN SOFT N	alkohol	cca 3ml/2x5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)				
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	cca 3ml/2x5ml	30 sec	ABTM(V)				
			SKINMAN SOFT PROTECT FF	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	20 sec./1,5min	ABTM(V)	pro alergiky			
			SEPTODERM BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	30 sec./2x1,5min	A(B)(TMV)				
			SEPTODERM GEL BAG	alkohol	cca 3ml/2xml	30 sec./2x1,5min	A(B)(TMV)				
			SEPTODERM SOFT (BAG)	alkohol	cca 3ml/2xml	30 sec./2x1,5min	A(B)(TMV)				
			SPRINGEL COMPLETE	alkohol	cca 3ml/2x 5ml	30 sec./2x1,5min	ABTM(V)				
			SOFTA MAN VISCORUB	alkohol	cca 3ml/2x 5 ml	30 sec./2x1,5min	A(B)(TMV)				
			SILONDA	---	---	---	---				
			BALMEA/BALMEA PROTECT	regenerační krém	nanést potřebné množství podle potřeby a typu pokožky	---	---				
			SKINSEPT F	alkohol, chlorhex. perox.	neředí se	min. 15 s puntka 1 min	A(B)(TMV)	pokožka s velkým množstvím mazových žláz až 10 min			
CITROCLOREX 2% CLEAR (zelená etiketa)	ethanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	15 s	A(B)(TMV)	remanentní účinek 6 hodin						
SKINSEPT G	alkohol	neředí se	---	A(B)(TMV)							
Braunoderm	alkohol, PVP-jod	neředí se	dle návodu výrobce	A(B)(TMV)	nechat vůň zcela zaschnout						
CHLORHEXIDIN 2% alcoholic solution barvený	chlorhexidin, alkohol	neředí se	2 min	A(B)(V)	vhodný i na vstupní centrálních žilních katétřů						
INCIDIN M SPRAY EXTRA	alkohol, chlorhex., perox.	neředí se	do zaschnutí	A(B)(V)	vhodné pro diabetiky						
CITROCLOREX 2% MD (sedá etiketa)	isopropanol, chlorhexidin diglukonát	neředí se	1 min	A(B)(TMV)	remanentní účinek 24 hodin - použit při každé aplikaci						
Katétrů	katétrů, spojovací hadičky		SKINMAN SOFT N / FOAM	chlorhexidin, KAS	hygienické mytí rukou	30 sec	cca 3ml	mycí emulze, reziduální účinek až 24 hodin, pěnová forma pro imobilní pacienty			
			SKINMAN SOFT N / FOAM	chlorhexidin, KAS	dekolonizace MRSA	1 min	A(B)(V)				
Sliničce	dezinfekce sliznic	před gynekol. a urol. zákroky, cévkování, hygiena ústní dutiny	SKINSEPT MUCOSA	alkohol, chlorhexidin, peroxid vodíku	neředí se	60 s	A(B)(V)	reproduovat do oči dekolonizace MRSA			
			OCTENSEPT	ectenidihydrochlorid	neředí se	60 s	A(B)(V)				
Sliničce	rány	výplachy z opláchny ran	BRAUNOL	PVP-jod	ředění dle návodu	60 s	ABCTMV				
			BRAUNOL	PVP-jod	ředění dle návodu	60 s	ABCTMV				

platnost od 1.3.2018