






DEZINFEKČNÍ PLÁN

Co?	Kdy?	Jakým způsobem?	Čím?	Kolik?			Expozice (účinnost po...)	Spektrum účinnosti
				koncentrace	ředění na 1l pracovního roztoku	ředění na 10l pracovního roztoku		
DEZINFEKCE RUKOU 	před a po ukončení ošetrovatelských úkonů po kontaktu s kontaminovaným materiálem po použití WC	nanést 3 ml přípravku na suchou pokožku zbavenou mechanických nečistot vtírat po dobu 30 s. kdy musí být pokožka stále vlhká	ACTODERMANOL hygienická dez. rukou 30 s. chirurgická dez. rukou 1,5 min DESDERMAN pure/gel hygienická dez. rukou 30 s. chirurgická dez. rukou 1,5 min	koncentrát			30 s.	ABTMV,MRSA etanol ABTMV,MRSA etanol+bifenol
DEZINFEKCE POKOŽKY 	před injekčními vpichy, odběry, před a po drobných zákrocích, při ošetrovatelských úkonech	aplikujte přípravek a dodržte expoziční čas sliznice, před zaváděním urologických katetrů dekolonizace pacientu s MRSA - mycí emulze	KODAN TINKTUR forte pře vpichem exp. 15 s. OCTENISEPT exp. 1 min. OCTENISAN exp. 2 min.	koncentrát			15 s. 1 min. 2 min.	A(B)TMV,MRSA etanol+peroxid A(B)V,MRSA octenidim MRSA octenidim
EMITNÍ MISKY NÁSTROJE 	po použití při kontaminaci	ponořte použité emitní misky nástroje do dezinfekčního roztoku, mechanicky dočistit, opláchnout vodou, osušit	NEODISHER Septo Preclean 1, % - 15 min. ACTOSED PA Powder 1,62 % - 15 min. , odměrka	1 %	10 ml	100 ml	15 min.	A(B)V,MRSA amin ABCMTV,MRSA kys. Peroctová
MALÉ PLOCHY přístroje vyšetřovací lehátka špatně dostupná místa	po použití při kontaminaci biologickým materiálem	aplikujte přípravek a důkladně smočte sprejem, dodržete expoziční čas	ACTOANID / MIKROZID senz. koncentrát/ubrousek - 1 min. citlivé materiály ACTOSEPT AF / MIKROZID AF koncentrát/ubrousek - 1 min.	koncentrát			1 min. 1 min.	A(B)V,MRSA KAS A(B)TMV,MRSA alkoholy
PLOCHY a POVRCHY podlahy, parapety postele, stolky klíčky, vozíky, sedačky nádoby na odpad omyvatelné stěny	dle provozního řádu	dezinfekce a úklid se provádí na mokro, dezinfekčním roztokem důkladně smočit dezinfikovanou plochu nebo povrch, vytřít	ACTOANID Flache new 1% 15 min. měsíc používání: 1,3,5,7,9,11 DESAM PRIM 2% 15 min. měsíc používání: 2,4,6,8,10,12	1,0%	10 ml	100 ml	15 min.	A(B)TV,MRSA KAS ABV,MRSA Chlór
PODLAHY	při změně dezinfekce	odmytí zaschlé vrstvy dez.	ProFloor Basic	0,5%	5 ml	50 ml	do zaschnutí	čisticí
VANY MATRACE 	po použití dle potřeby		TERRALIN Protect 2% 15 min. 0,5% 60 min.	2 %	20 ml	200 ml	15 min.	A(B)TMV,MRSA KAS A(B)V,MRSA
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ WC ,koupelny sprchové kouty obklady 	denně dle potřeby	důkladně smočit dezinfekčním roztokem, dodržet expoziční čas	DESAM PRIM 2% 15 min. CHRORAMIX DT 1 tbl. na 5l vody 1 tbl. na 1,5l vody vysoká zátěž	2 %	20 ml	200 ml	15 min.	ABV,MRSA Chlór ABMV,MDSA ABCTMV, MRSA Chlór