






Centrum sociálních služeb Praha 2, příspěvková organizace

Dezinfekční plán: SUDÝ MĚSÍC (Oxivir Plus)



(Únor, Duben, Červen, Srpen, Říjen, Prosinec)

Sealed Air

				Přípravek	Koncentrace	Doba působení	Účinná látka	Účinnost	Kdy	Jak
	Ruce	dezinfekce	dezinfekce	Soft Care Des E	3 ml	30 s	ethanol (obsahuje hydratační složku)	A,B,T,M,V	před a po kontaktu s pacientem; po kontaktu s kontaminovanými místy; před výkony vyžadující aseptické podmínky, po kontaktu s tělními tekutinami	hygienická dezinfekce rukou - vtírat do rukou tak, aby byly po celou dobu aplikace vlhké
	Plochy okolí pacienta	stolky, madla, nástroje, různé povrchy v okolí pacienta	dezinfekce	Oxivir Plus Spray	3,5% (přes dávkovací zařízení)	5-15 min.	zrychlený peroxid vodíku	A,B,T,M,V, Tbc	Denně nebo dle doporučení v zařízení	nanést na povrch postřikem, nechat působit a setřít
	Plochy	stoly, židle, plochy, omyvatelné povrchy, dveře, apod.	dezinfekce	Oxivir Plus Spray	3,5% (přes dávkovací zařízení)	5-15 min.	zrychlený peroxid vodíku	A,B,T,M,V, Tbc	Denně nebo dle doporučení v zařízení	nastříkat na celou plochu, rozetřít
		plošná dezinfekce s čisticím účinkem	dezinfekce	Oxivir Plus	3,5% (přes dávkovací zařízení)	15 min	zrychlený peroxid vodíku	A,B,T,M,V, Tbc	všechny prostory - 1 x denně na vlhko	dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít, nechat působit; nechat oschnout
		toalety, vany, sprchové kouty, sanitární zařízení, odpady	dezinfekce	Oxivir Plus	3,5% (přes dávkovací zařízení)	15 min	zrychlený peroxid vodíku	A,B,T, M,V, Tbc	všechny prostory - 1 x denně na vlhko	dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít, nechat působit; nechat oschnout
	Podlahy	omyvatelné podlahy	dezinfekce	Oxivir Plus	3,5% (přes dávkovací zařízení)	15 min.	zrychlený peroxid vodíku	A,B,T, M,V, Tbc	1 x denně nebo dle doporučení v zařízení	umýt roztokem



Dezinfekce v případě epidemiologicky závažných situací

	epidemiologick y závažné situace	ruce	dezinfekce	Soft Care Des E	3ml	1,5min	ethanol (obsahuje hydratační složku)	A,B,T,M,V	stejně jako u běžné dezinfekce	stejně jako u běžné dezinfekce
		plochy a povrchy	dezinfekce postřikem	Oxivir Plus Spray	3,5% (přes dávkovací zařízení)	5-15 min.	zrychlený peroxid vodíku	A,B,T,M,V, Tbc	1-3x denně dle typu prostoru	nanést postřikem, nechat zaschnout

Vysvětlivky:
A - usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub
B - virucidní účinek na široké spektrum viru
(B) - omezená virucidní účinnost / účinnost na HBV/H1V
C - inaktivace bakteriálních spor
T - usmrcení mykobakterií kompl. M.Tuberculo sis
M - usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií
V - fungicidní účinek na mikroskopické vláknité houby

