

ochranná opatření	Fyzická izolace infikovaných osob a pokud je to vůbec možné, umístění na jednolůžkových pokojích s záchodem a umyvadlem vyhrazeným pouze pro infikovaného. U pacientů se stejným typem patogenu je možná skupinová izolace. Nutné poučení pacienta, personálu a návštěv!
	Izolace nesmí být přerušena alespoň do té doby, než dojde ke zmírnění příznaků, je třeba to pokud možno uskutečnit až na základě laboratorní diagnózy.
	Používání jednorázových ochranných rukavic a pláště v případě přímého styku zdravotnického personálu s pacienty a možného styku s kontaminovanými materiály, přístroji nebo předměty. Likvidace rukavic v uzavřené odkládací nádobě ještě před odchodem z pacientova pokoje.
	Přeprava špinavého prádla výhradně v uzavřených označených PVC pytlích. Prádelna musí garantovat termo nebo chemotermo dezinfekci označeného prádla.
	Nepřepravovat infikované osoby, pokud to není naprosto nezbytné. V případě plánovaného přemístování pacienta, předběžné informování přijímající instituce o pacientově onemocnění po dokončení přepravy důkladná dezinfekce všech předmětů a zařízení, se kterými pacient přišel do styku.
	Přeprava nádobí a příborů v uzavřených kontejnerech, mytí nádobí strojním způsobem při teplotách $\geq 60^\circ\text{C}$. Řádná likvidace kontaminovaného jídla.

hygienická opatření	Zamezení střídání personálu mezi jednotlivými odděleními					
	přísné dodržování pravidel hygieny rukou	Po každém kontaktu s pacienty a po styku s potenciálně kontaminovanými předměty nebo materiály je nutné ruce napřed důkladně umýt mýdlem a poté osušit pomocí jednorázových ručníků.				
	v případě styku s infikovanými pacienty povinné používání jednorázových rukavic	Následně pečlivá dezinfekce rukou pomocí prostředku na bázi alkoholu.				
	důsledná realizace opatření v oblasti hygieny povrchů	Všechny kontaktní povrchy v okolí pacientů, jako například stoly po stranách lůžek, rámy lůžek a kliky dveří, je nutno otírat za použití dez. prostředku se sporicidním účinkem.				
	správná příprava a používání pomůcek a lékařských přístrojů	Co největším rozsahu používat jednorázové předměty a pomůcky. Na směnu vždy čistá uniforma + dodržení bariérového ošetřování. Lékařské přístroje, stetoskopy a klinické teploměry by se měly vždy používat pouze u stejných konkrétních pacientů a po použití musejí být dezinfikovány.				
	omezení infikování okolí pacienta	Aby se zamezilo přenosu bakterií prostřednictvím kontaminovaných matrací, doporučuje se používání jednorázového povlečení.				

	CO	KDY	JAK	ČÍM	KONCENTRACE -	ÚČINNOST
	mytí rukou	před a po práci s pacientem	vodou a mycí emulzí	Manisoft Manisoft foam	neředí se	
	hygienická dezinfekce rukou	před a po kontaktu s pacientem	aplikace na suché ruce	Skinman soft Protect	1 x 30 vteřin	A(B)TMV
		před manipulací s invazivními pomůckami				
		po kontaminaci biologickým materiálem				
hygienická dezinfekce rukou	po kontaktu s okolím pacienta					
	nástroje a lékařské pomůcky	vždy po použití	zcela ponořit do roztoku, nástroje rozevřít, po expozici mechanicky vyčistit pod hladinou dez. roztoku, oplach, osušení, zabalení, sterilizace.	Sekusept aktiv	2% - 15 minut	ABCTMV
				Sekusept forte	1,5% - 6 hodin	ABCTMV
	dezinfekce ploch k zábraně opětovné kontaminace	dle nařízení odpovědného pracovníka	připraveným dez. roztokem vytřít namokro	Incidin Rapid	1% - 60 minut	ABCTMV
				Medicarine	4 tbl. / 10 l vody - 15 minut	ABCTMV
				Sekusept Aktiv	2% - 15 minut	ABCTMV
	Návod k použití: odšroubujte bílý uzávěr. V případě otočení láhve dnem vzhůru (o 180°) vyteče z dávkovače 20 ml koncentrátu, pro dávku dalších 20 ml je třeba znovu otočit láhev do polohy dnem dolů a v případě vyšší dávky postup opakovat – otočit opět láhev dnem vzhůru. Pozor - pokud otočíte láhev pouze o 90°, vytéká z ní koncentrát kontinuálně bez přerušení. Tento způsob aplikace poslouží v případě, kdy se provádí ředění pomocí odměrky.					
	1 dávka do 8 litrů studené vody	0,25 % roztok	Láhev je vybavena dvěma uzávěry – hrdlo se zeleným uzávěrem slouží k doplňování koncentrátu z větších balení (6 l kanystr), hrdlo s bílým uzávěrem obsahuje integrovaný dávkovač a slouží k dávkování koncentrátu do předem definovaného množství vody.			
	2 dávky do 8 litrů studené vody	0,50 % roztok				
	3 dávky do 8 litrů studené vody	0,75 % roztok				