

Oblast použití		Četnost	Přípravek	Účinnost přípravku		Konc. / expozice	Způsob aplikace
	Mechanické mytí rukou	Dle potřeby	Dle nabídky skladu	hypoalergenní mycí emulze (pH 5,5 – s obsahem hydratačních a hojivých složek)		30 s	Obvyklým způsobem
	Hygienická dezinfekce rukou	Před, po vyšetření pacienta, při kontaminaci.	Softa Man® ViscoRub ProCura OP sept Softalind Hand Sanit. ProCura Viral	A,(B),T, M, V A,(B),T, M, V A,(B),T, M, V A, B,T, M, V	Alkohol	3 ml / 30 s	Vtírat do suchých rukou po předepsanou dobu
	Ošetření rukou	Dle potřeby	Dle nabídky skladu	nemastná emulze mastná emulze		dle potřeby	Vtírat do pokožky několikrát denně
	Ošetření kůže před vpichem a punkcemi	Před vpichem injekce, odběrem krve, punkcemi, ČŽK + AK	Softasept® N Braunol	A, B, M, T, V A,B,C,M,T,V,	Alkohol PVP-jód	konc. / 15 s konc. / do zaschnutí	Pokožku důkladně smočit, nechat působit (zaschnout) Pokožku důkladně natřít, nechat působit
	Sliznice, rány Antiseptické oplachy a výplachy	Dle indikace	Braunol® Skinsept Mucosa	A,B,C,M,T,V, A, V, MDRO	PVP-jód PHX	1:2 až 1:10 koncentrát	Naředit těsně před použitím, dostatečně smočit, nechat působit (do zaschnutí) Dle indikace (viz informace pro uživatele)
	Rozšířená předoperační příprava Dekontaminace povrchu těla od MDRO (MRSA, VRE, EBSL...)	Dle indikace	Prontoderm® Prontoderm Nasal gel ProntOral ProCura Deconta	A, V, MRO	PHX	koncentrát	Otřít celé tělo jednorázovými utěrkami – neoplachovat nechat působit (ústa ProntOral, nos-úši Nasal gel) Omytí celé tělo dle indikace (viz informace pro uživatele)
	Instrumentárium, nástroje a pomůcky z kovu, skla, gumy, plastů	Po použití	1. Sekusept Plus 2. Bomix Plus	A, (B), T, V A, (B), T, V	KAS Glukoprotamin	1,0 % / 15 min 0,5 % / 15 min	Ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout pitnou vodou
	Vyšší stupeň dezinfekce (endoskopy – optické přístroje)	Okamžitě po použití	Meliseptol® ubrousky	A, B, M, T, V	Alkohol + KAS	konc. / 1 min	Otřít ubrouskem povrch přístroje, odstranit hrubé nečistoty
		Po použití dekontaminovat	1. Sekusept Plus 2. Bomix Plus	A, (B), T, V A, (B), T, V	KAS Glukoprotamin	1,0 % / 15 min 0,5 % / 15 min	Ponořit do pracovního roztoku, během expozice mechanicky vyčistit, opláchnout pitnou vodou
		Po dekontaminaci VSD	Helipur H+N Sekusept Aktiv	A,B,C,M,T,V, Kys. peroxyoctová	4 % / 30 min 6 % / 15 min 2,0% / 15 min	Ponořit do pracovního roztoku, po expozici opláchnout sterilní vodou	
  	Čajové kuchyňky (lednice, nádobí apod.)	Dle provozního řádu oddělení	ProCura Klorsept	A, B, M, V	Troklosennatrium	1 tbl. 5l / 30 min	Lednice odmrázit, vymýt pracovním roztokem nechat zaschnout, po expozici vytřít vodou; nádobí po expozici opláchnout pitnou vodou
	Výlevky, umyvadla, vodovodní sifony apod.	1x denně	Chloramix DT	A,B,C,T,M,V	KAS, Amin	1 tbl. 5l / 30 min	Mechanicky očistit, rozrušit biofilm Zalít pracovním roztokem a nechat působit
	Povrchy předmětů, pracovní plochy, stoly, lehátka, vozíky, postele, stolky, vyšetřovací stoly	Po použití, 1x nebo 3x denně	1. Terralin Protect 2. Desam Effekt	A, (B), V A, (B), T, V	KAS, Amin Amin, KAS	0,25 % / 15 min 0,50 % / 60 min 0,25 % / 15 min 0,50 % / 30 min	Plochy setřít pracovním roztokem a nechat působit do uschnutí
	Citlivé materiály, přístroje, monitory, vře, zrcadla, koženky, ultrazvuk, sondy, akrylát, macrolon, silikon, atd.	Po použití	Meliseptol® FoamPure Meliseptol® Wipes Sensitive	A,B,M,T,V,	Alkohol, KAS	konc. / 1 min	Nanést pěnu a rozetřít po povrchu, nechat zaschnout Setřít ubrouskem
	Rychlá dezinfekce - malé plochy	Dle potřeby	Meliseptol Rapid ProCura spray Off touch	A,B,C,T,M,V A, B, M, T, V	Alkohol, KAS	konc. / 1 min	Nanést z malé vzdálenosti a rozetřít po povrchu Setřít ubrouskem a nechat působit
	Sanitární dny a zvýšený hygienický režim	Dle potřeby	ProCura PE Chloramix DT	A,B,C,T,M,V A,B,C,T,M,V	kys. peroctová KAS, Amin	0,30 % / 30 min 1 tbl. 5l / 30 min	Setřít plochu a nechat působit

1. =lichý měsíc / 2. =sudý měsíc – používání

Účinnost přípravků: A
(B)
B
C
M

bakterie (včetně MRSA, VRE), kvasinky
omezeně virucidní
plně virucidní
spóry bakterií
mykobakterie

T Mykobacterium tuberculosis
V plísně (vláknité houby)
MRSA Methicilin rezistentní Staphylococcus aureus
MDRO Multi-drug resistantní-organismus (MRSA, VRE, EBSL)

TABULKA ŘEDĚNÍ PRACOVNÍHO ROZTOKU

množství roztoku koncentrace roztoku	1 litr	2 litry	3 litry	4 litry	5 litrů	6 litrů	7 litrů	8 litrů	9 litrů	10 litrů
0,25%	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	12,5 ml	15 ml	17,5 ml	20 ml	22,5 ml	25 ml
0,3%	3 ml	6 ml	9 ml	12 ml	15 ml	18 ml	21 ml	24 ml	27 ml	30 ml
0,5%	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	35 ml	40 ml	45 ml	50 ml
1,0%	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	70 ml	80 ml	90 ml	100 ml
1,5%	15 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	105 ml	120 ml	135 ml	150 ml
2,0%	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	140 ml	160 ml	180 ml	200 ml
4,0%	40 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	280 ml	320 ml	360 ml	400 ml
6,0%	60 ml	120 ml	180 ml	240 ml	300 ml	360 ml	420 ml	480 ml	540 ml	600 ml

Zpracoval: Bc. Dagmar Ragulská, Referát ochrany veřejného zdraví
Platnost od: 1.7. 2016